

BAB V

SIMPULAN DAN PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab yang sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ibu primigravida memiliki risiko lebih besar untuk mengalami preeklamsi di Rumah Sakit Aura Syifa Kediri pada bulan Januari – Desember tahun 2018.
2. Ibu multigravida memiliki risiko lebih kecil untuk mengalami preeklamsi di Rumah Sakit Aura Syifa Kediri pada bulan Januari – Desember tahun 2018.
3. Risiko kejadian preeklamsi pada ibu primigravida 4,393 kali lebih besar jika dibandingkan dengan ibu multigravida.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk bahan masukan bagi tempat penelitian agar memberikan pelayanan dan asuhan kebidanan yang lebih baik pada ibu yang memiliki risiko mengalami preeklamsi sehingga harapannya komplikasi preeklampsia dapat diminimalkan dan dapat mengurangi angka kematian ibu, seperti dalam memberikan asuhan pada ibu yang memiliki faktor risiko mengalami preeklamsi lebih diperhatikan.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menjadi tambahan literatur dan tambahan informasi untuk penelitian yang berkaitan dengan Kejadian Preeklamsi, serta menambah referensi mengenai perbedaan risiko preeklamsi pada ibu primigravida dan multigravida. Sehingga peneliti berikutnya dapat meneliti lebih luas mengenai faktor risiko kejadian preeklamsi.