

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh pemberian meremas plastisin terhadap intensitas nyeri pasca operasi laparatomi dapat disimpulkan:

1. Rata-rata tingkat nyeri pada kelompok perlakuan sebelum dan sesudah diberikan terapi meremas plastisin adalah 5,4 (nyeri sedang) dan 2,0 (nyeri ringan).
2. Rata-rata tingkat nyeri pada kelompok kontrol sebelum dan sesudah diberikan terapi standar terapi rumah sakit (*ketorolac*) adalah 5,5 (nyeri sedang) dan 2,65 (nyeri ringan).
3. Ada pengaruh meremas plastisin terhadap nyeri pasca operasi laparatomi pada kelompok perlakuan.
4. Ada perbedaan tingkat nyeri sebelum dan sesudah diberikan intervensi pada kelompok perlakuan dan kontrol.

5.2 Saran

1. Bagi Rumah Sakit

RS Lavalette Malang dapat menerapkan terapi meremas plastisin didalam standar operasional prosedur untuk mengurangi nyeri pasien pasca operasi laparatomi

2. Bagi Institusi

Institusi dapat menjadikan meremas plastisin menjadi media dalam proses belajar mengajar.

3. Bagi Responden

Responden dapat memperoleh terapi meremas plastisin sebagai intervensi dalam menurunkan nyeri pasca operasi, khususnya operasi laparatomi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti pasien pasca operasi laparatomi disarankan untuk meneliti efektifitas meremas plastisin dengan terapi modulasi lainnya sebagai pembanding dalam penelitian ini.