

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian “Perbedaan Tingkat Kejadian PONV (*PostOperative Nausea and Vomiting*) pada Pasien Post Operasi dengan General Anestesi dan Spinal Anestesi” dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pasien PONV pada general anestesi hampir setengahnya mengalami mual muntah berat
2. Pasien PONV pada spinal anestesi sebagian besar mengalami mual muntah ringan
3. Hasil uji menunjukkan bahwa tingkat kejadian PONV pada pasien post operasi dengan general anestesi dan spinal anestesi memiliki perbedaan yang signifikan

5.2 Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dapat menjadi bahan atau materi pembelajaran baik kalangan mahasiswa pendidikan sarjana terapan keperawatan maupun profesi agar dapat memahami tentang perbedaan tingkat kejadian PONV pada pasien post operasi dengan general anestesi dan spinal anestesi.

2. Bagi Rumah Sakit

Bagi rumah sakit khususnya bagi perawat dapat mengoptimalkan strategi pencegahan dan pengelolaan PONV, sehingga meningkatkan kualitas perawatan dan kepuasan pasien pasca operasi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih spesifik seperti memperluas sampel dan menggunakan teknik analisis yang berbeda sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian serta bisa menambahkan variable maupun intervensi yang diberikan pada pasien PONV.